

FERTIFOL®

Lote N°: Fecha fabric./Fecha venc.:

**Fertilizante inorgánico a base de
macro y micronutrientes**

Líquido en solución

Composición	% m/v
Materia seca (% m/m)	25,4
Nitrógeno ureico (N)	7,0
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅)	7,0
Óxido de Potasio (K ₂ O)	4,0
Hierro (Fe)	0,05
Zinc (Zn)	0,05
Manganeso (Mn)	0,04
Cobre (Cu)	0,01

Contaminantes	ppm
Arsénico	< 0,5
Cadmio	< 0,5
Cromo VI	< 2
Mercurio	< 0,5
Níquel	< 10
Plomo	< 0,5

Parámetros fisicoquímicos	
Densidad (a 20°C)	1,13 g/mL
pH (10% a 20°C)	5,8

Fabricado por

Agrospec®

Camino El Milagro 257, Maipú. Santiago, Chile.

agrospec.cl

Contenido neto:

Principales características

Fertilizante de rápido efecto sobre las plantas. Su equilibrada fórmula proporciona macro y micronutrientes que contribuyen a mejorar la condición general de los cultivos. Corrige deficiencias de cobre y zinc.

Recomendaciones de uso vía foliar

Cultivo	Dosis	Observaciones
Vid de mesa, vid pisquera y vid vinífera.	300 - 500 cc/100 L	En plantaciones nuevas y en producción, aplicar solo o en mezcla con fitosanitarios. Realizar 3 a 5 aplicaciones por temporada cada 10 a 15 días.
Almendro, arándano, avellano europeo, castaño, cerezo, ciruelo, clementino, cranberry, damasco, duraznero, frambueso, frutilla, kiwi, limonero, mandarino, manzano, membrillero, mora, naranjo, nectarino, nogal, olivo, palto, peral, pistacho, pomelo, tangelo y zarzaparrilla.	300 - 500 cc/100 L	Aplicar solo o en mezcla con fitosanitarios. No aplicar durante la floración. Realizar 3 a 5 aplicaciones por temporada cada 10 a 15 días.
Acelga, achicoria, ají, ajo, almácigos, apio, berenjena, brócoli, bunching, cebolla, chalota, ciboulette, coliflor, espinaca, lechuga, melón, pepino, pimentón, puerro, rábano, repolito de bruselas, repollo, rúcula, sandía, tomate, zapallo y zapallo italiano.	200 - 300 cc/100 L	Aplicar solo o en mezcla con fitosanitarios. Considerar el uso de humectantes o adherentes en plantas difíciles de mojar. Realizar 2 a 3 aplicaciones por temporada en el ciclo del cultivo cada 10 a 14 días.
Avena, cebada, leguminosas de grano, maíz, oleaginosas, trigo y triticale.	2 - 3 L/ha	Se puede utilizar junto a las aplicaciones aéreas. Realizar 1 a 2 aplicaciones por temporada.
Praderas	2 - 3 L/ha	Aplicar cada 7 a 10 días, después de cada corte.
Ornamentales	200 - 300 cc/100 L	Aplicar 1 vez por semana. Plantas en maceta: aplicar 1 vez por semana, regando con una solución de 7 cc de Fertifol /10 litros de agua.
Papa, remolacha y zanahoria.	2 - 3 L/ha	Realizar 3 a 5 aplicaciones cada 15 días.

Instrucciones de uso

Al ser aplicado con fitosanitarios, debe ser agregado como primer componente de la mezcla. No debe ser aplicado durante la floración, por las posibles alteraciones que puede causar el producto sobre ésta.

Incompatibilidad y fitotoxicidad

- Incompatible con productos alcalinos como primer componente de la mezcla.
- Compatible con la mayoría de los productos agrícolas de uso común. Para mayor seguridad, realizar pruebas de compatibilidad previas a pequeña escala.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

Precauciones

- Producto no tóxico, sin embargo, usar medidas de protección propias del manejo de un fitosanitario. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipo de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
- Condiciones de almacenamiento: conservar en una bodega seca, fresca y ventilada, protegido de la luz solar directa, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta.

® marca registrada de Agrospec S.A.