



NOMBRE COMUN	Fertifol®																
INGREDIENTE ACTIVO	Nitrógeno ureico + pentóxido de fósforo + óxido de potasio + hierro + zinc + manganeso + cobre.																
FORMULACION	Líquido en solución																
COMPOSICION	<table><tr><td></td><td>% m/v</td></tr><tr><td>Nitrógeno ureico (N)</td><td>7,0</td></tr><tr><td>Pentóxido de Fósforo (P₂O₅)</td><td>7,0</td></tr><tr><td>Óxido de Potasio (K₂O)</td><td>4,0</td></tr><tr><td>Hierro (Fe)</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Zinc (Zn)</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Manganeso (Mn)</td><td>0,04</td></tr><tr><td>Cobre (Cu)</td><td>0,01</td></tr></table>		% m/v	Nitrógeno ureico (N)	7,0	Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅)	7,0	Óxido de Potasio (K ₂ O)	4,0	Hierro (Fe)	0,05	Zinc (Zn)	0,05	Manganeso (Mn)	0,04	Cobre (Cu)	0,01
	% m/v																
Nitrógeno ureico (N)	7,0																
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅)	7,0																
Óxido de Potasio (K ₂ O)	4,0																
Hierro (Fe)	0,05																
Zinc (Zn)	0,05																
Manganeso (Mn)	0,04																
Cobre (Cu)	0,01																

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Fertifol es un fertilizante de rápido efecto sobre las plantas. Su equilibrada fórmula proporciona macro y micronutrientes que contribuyen a mejorar la condición general de los cultivos. Corrige deficiencias de cobre y zinc.

RECOMENDACIONES DE USO

Vía foliar

Cultivo	Dosis	Observaciones
Vid de mesa, vid pisquera y vid vinífera.	300 - 500 cc/100 L	Aplicar solo o en mezcla con fitosanitarios. Realizar 3 a 5 aplicaciones por temporada cada 10 a 15 días.
Almendro, arándano, avellano europeo, castaño, cerezo, ciruelo, clementino cranberry, damasco, duraznero, frambueso frutilla, kiwi, limonero y mandarino.	300 - 500 cc/100 L	Aplicar solo o en mezcla con fitosanitarios. No aplicar durante la floración. Realizar 3 a 5 aplicaciones por temporada cada 10 a 15 días.

Cultivo	Dosis	Observaciones
Manzano, membrillero Mora, naranjo, nectarino, nogal, olivo, palto, peral, pistacho, pomelo, tangelo y zanahoria	300 - 500 cc/100 L	Aplicar solo o en mezcla con fitosanitarios. No aplicar durante la floración. Realizar 3 a 5 aplicaciones por temporada cada 10 a 15 días.
Acelga, achicoria, ají, ajo, almácigos, apio, berenjena, brócoli, bunching, cebolla, chalota, ciboulette, coliflor, espinaca, lechuga, melón, pepino, pimentón, puerro, rábano, repollito de bruselas, repollo, rúcula, sandía, tomate, zapallo y zapallo italiano.	200 - 300 cc/100 L	Aplicar solo o en mezcla con fitosanitarios. Considerar el uso de humectantes o adherentes en plantas difíciles de mojar. Realizar 2 a 3 aplicaciones por temporada durante el ciclo del cultivo, cada 10 a 14 días.
Avena, cebada, leguminosas de grano maíz, oleaginosas trigo y triticale.	2 - 3 L/ha	Se puede utilizar junto a las aplicaciones aéreas. Realizar 1 a 2 aplicaciones por temporada.
Praderas	2 - 3 L/ha	Aplicar cada 7 a 10 días, después de cada corte.
Ornamentales	200 - 300 cc/100 L	Aplicar 1 vez por semana. Plantas en maceta: aplicar 1 vez por semana, regando con una solución de 7 cc de Fertifol por 10 litros de agua.
Papa, remolacha y zanahoria.	2 - 3 L/ha	Realizar 3 a 5 aplicaciones cada 15 días.

INSTRUCCIONES DE USO

- Si se aplica junto a fitosanitarios, agregar como primer componente de la mezcla.
- No aplicar durante la floración, por las posibles alteraciones que puede causar el producto sobre ésta.

INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

- Incompatible con productos alcalinos como primer componente de la mezcla.
- Compatible con la mayoría de los productos agrícolas de uso común. Para mayor seguridad, realizar pruebas de compatibilidad previas a pequeña escala.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

® marca registrada de Agrospec S.A.