



NOMBRE COMUN	Fosfonat 40-20		
INGREDIENTE ACTIVO	Fosfito de potasio		
FORMULACION	Concentrado Soluble (SL)		
COMPOSICION	Fosfito de potasio K_2HPO_3 685 g/L, contenido mínimo de anión fosfito.		
		% p/p	% p/v
	Fósforo (P_2O_5)	40	60
	Potasio (K_2O)	20	30

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Fosfonat® 40-20 es un fertilizante líquido de uso foliar y al suelo, formulado en base a fosfito de potasio. Se absorbe rápidamente por la planta, traslocándose en forma ascendente y descendente. Se caracteriza por aportar nutrientes como fósforo y potasio, estimular el crecimiento radicular y de brotes, aumentar la cuaja y mejorar la calidad de la fruta.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis (L/ha)	Observaciones
Vid de mesa Vid pisqueta Vid vinífera	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación o en cada inicio de <i>flash</i> radicular. Repetir cada 15 a 20 días.
Manzano Peral	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación y repetir cada 30 días. De ser necesario, aplicar antes de la cosecha o en caso de condiciones propicias para el desarrollo de alguna enfermedad.
Almendro Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero Nectarino	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación o en cada inicio de <i>flash</i> radicular. Repetir cada 30 días.

Cultivo	Dosis (L/ha)	Observaciones
Limonero Mandarino Naranja Pomelo	3 - 5	Aplicar desde inicio de brotación, cada 20 a 30 días, sobre todo si se presentan condiciones favorables de humedad o agua libre.
Arándano Frambueso Fruittilla	2 - 4	Aplicar desde el inicio de brotación o en cada <i>flash</i> de crecimiento radicular, repetir cada 15 a 20 días.
Hortalizas	1 - 3	Aplicar durante todo el cultivo, repetir cada 7 a 10 días.
Olivo	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación o a cada inicio de <i>flash</i> radicular, con una frecuencia de 30 días.
Kiwi	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación o en cada inicio de <i>flash</i> radicular, con una frecuencia de 30 días.
Avellano Nogal	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación o a cada inicio de <i>flash</i> radicular, con una frecuencia de 30 días.
Palto	3 - 5	Aplicar al inicio de brotación o a cada inicio de <i>flash</i> radicular, con una frecuencia de 30 días.

Se puede aplicar vía aérea o terrestre, al follaje como al suelo, durante todo el ciclo del cultivo, principalmente en situaciones de estrés.

Para equipos terrestres, no usar concentraciones superiores a 300 cc/100L de agua. Para equipos electrostáticos y/o aéreos, consultar a nuestro Departamento Técnico.

FITOTOXICIDAD

El uso de **Fosfonat® 40-20** en mezcla con sales insolubles de cobre (ej: hidróxido de cobre, óxido cuproso, oxiclورو de cobre, caldo bordelés y sales básicas de cobre) puede inducir fitotoxicidad. Además, se recomienda dejar pasar 10 días luego de una aplicación de cobre para aplicar **Fosfonat® 40-20**.

COMPATIBILIDAD

- **Fosfonat® 40-20** es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común.
- Evitar aplicar en mezcla con dimetoato, aceites y productos a base de cobre.

TIEMPO DE REINGRESO

Sin restricciones.

© marca registrada de Agrospec S.A.