



NOMBRE COMUN	Kaktiv	
INGREDIENTE ACTIVO	Potasio	
FORMULACION	Polvo Soluble (SP)	
COMPOSICION	Potasio (K ₂ O)	% p/p 38,6

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Kaktiv es un fertilizante foliar 100% soluble, formulado en base a potasio altamente concentrado, lo que permite una rápida absorción por parte de la planta y/o frutos. Su aplicación mejora la calidad, aspecto, tamaño y uniformidad de los frutos, cuando es aplicado en los momentos oportunos.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación foliar:

Cultivo	Dosis		Observaciones
	g/100 L	kg/ha	
Vid de mesa Vid vinífera	150 - 250	Parronal: 2,5 mín. Espaldera: 1 mín.	Aplicar desde inicio de la brotación hasta pinta. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: - Parronal: 1.500 L/ha máx. - Espaldera: 1.200 L/ha máx.
Vid vinífera	250 - 350	Espaldera: 2,8 mín.	Aplicar desde pinta a precosecha con un mojamiento acorde al desarrollo del cultivo, evitando el escurrimiento. Intervalo entre aplicaciones: 7 días. Mojamiento sugerido: 800 - 1.000 L/ha.
Vid de mesa	--	3,75	Aplicar desde pinta a precosecha con equipo electrostático. Intervalo entre aplicaciones: 7 días. Mojamiento sugerido: 80 L/ha.
Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero Nectarino	200 - 350	3 mín.	Aplicar desde caída de pétalos a precosecha. Desde pinta, usar la dosis máxima. Utilizar un mojamiento acorde al desarrollo del cultivo, evitando el escurrimiento. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 1.000 - 1.500 L/ha.

Cultivo	Dosis		Observaciones
	g/100 L	kg/ha	
Mandarino	250	--	Aplicar desde inicio de brotación, mientras exista crecimiento nuevo. Utilizar un mojamiento acorde al desarrollo del cultivo, evitando el escurrimiento. Intervalo entre aplicaciones: 7 días. Aplicaciones: máximo 3 por brotación. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.500 L/ha.
Arándano	350	2,1 - 3,5	Aplicar desde inicio de floración a precosecha. Utilizar un mojamiento acorde al desarrollo del cultivo, evitando el escurrimiento. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 600 - 1.000 L/ha.
Frambueso Frutilla	350	2,1 - 2,8	Aplicar desde inicio de floración a precosecha con un mojamiento acorde al desarrollo del cultivo, evitando el escurrimiento. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 600 - 800 L/ha.
Pimentón Tomate	250 - 400	2 mín.	Aplicar desde el inicio del cultivo hasta antes de la cosecha. Utilizar un mojamiento acorde al desarrollo del cultivo, evitando el escurrimiento. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 500 - 1.000 L/ha.

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar con equipos correctamente calibrados.
- Usar un volumen de agua que permita mojar todo el follaje.
- El escurrimiento o sobredosis de producto puede generar depósitos visibles en bayas y frutos.
- No aplicar con temperatura mayor a 25°C. En mandarinos, no aplicar con temperatura mayor a 20° C.
- No acidificar.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregar agua al estanque hasta la mitad del volumen requerido con el agitador en funcionamiento. Luego, agregar lentamente al estanque la cantidad requerida de **Kactiv**. Finalmente, completar el volumen de agua con agitación constante. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución del producto.

FITOTOXICIDAD

- No es fitotóxico si se usa de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.
- Es posible observar temporalmente depósitos blancos sobre bayas o frutos, que desaparecerán con el tiempo.

COMPATIBILIDAD

- Compatible con surfactantes neutros.
- Se recomienda aplicar solo. En caso de requerir mezclar con otros productos, consultar al Depto. Técnico de Agrospec.

INCOMPATIBILIDAD

- Incompatible con productos de reacción ácida o que no puedan mezclarse con productos de reacción alcalina.
- No se recomienda aplicar en mezcla con productos con acción penetrante.