

Programa fitosanitario almendros



Almendros

	Previo a caída de hojas	Receso invernal	Yema hinchada	Floración	Fruto cuajado	Crecimiento de frutos	Post-cosecha
Enfermedades	Cáncer bacterial	piraclostrobin ^{250EC} 0,5 L/ha		piraclostrobin ^{250EC} 0,5 L/ha			
	Reducir presión de enfermedades		polisulfuro ^{350SL} CALCIO				
	Hongos de la madera		podaspec				
	Roya Tizón de la flor (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilia</i> spp.)				propiconazol ^{250EC} 0,5 L/ha		
	Botritis Tizón de la flor (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilia</i> spp.)				acierto ^{140EC} 75 - 125 cc/100 L boscalid ^{50% WG} 1,2 kg/ha difenoconazol ^{250EC} 20 cc/100 L piraclostrobin ^{250EC} 0,5 L/ha (solo en floración)		
	Tizón de la flor (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilia</i> spp.)				fusion ^{425SC} 130 cc/100 L (mín. 1,3 L/ha)		
	Cloca Corineo Monilia				clorotalonil ^{500SC} 180 - 200 cc/ha		
Oídio Tizón de la flor (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilia</i> spp.)				tebuconazol ^{430SC} 35 - 40 cc/100 L			
Ácaros e Insectos	Escama de San José		piriproxifen ^{100EC} 50 - 70 cc/100 L			acetamiprid ^{70% WP} 15 g/100 L	
	Arañitas Trips		abamectin ^{18EC} 80 - 100 cc/100 L			abamectin ^{18EC} 80 - 100 cc/100 L	
	Arañita parda Arañita roja europea Arañita bimaclada				espirodiclofen ^{240SC} 50 - 60 cc/ 100 L		
	Arañitas Burrito de la vid Eulia Pulgones					bifentrin ^{100EC} 60 cc/100 L	bifentrin ^{100EC} 60 cc/100 L
	Enrollador de los frutales Polilla oriental					metoxifenoimid ^{240SC} 15 - 20 cc/100 L (mín. 300 cc/ha)	
	Pulgones					bifentrin ^{100EC} 0,18 - 0,3 L/ha imidacloprid ^{70% WP} 10 - 15 g/100 L	
Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin ^{50% WP} 200 - 300 g/ha simazina ^{90% WG} 2 - 4 kg/ha					
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin ^{50% WP} 50 - 100 g/ha glifospec ^{480 SL} + glifospecplus ^{75% SG}					flumioxazin ^{50% WP} 50 - 100 g/ha glifospec ^{480 SL} + glifospecplus ^{75% SG}
	Post-emergente: anuales y perennes			glifospec ^{480 SL} 2,5 - 7 L/ha ⁽¹⁾		glifospecplus ^{75% SG} 1,1 - 4 kg/ha ⁽¹⁾	
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta				cletodim ^{240EC} 0,4 - 2 L/ha		

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.