

Programa fitosanitario
durazneros • nectarinos



Durazneros Nectarinos

Previo caída de hojas Receso invernal Yema hinchada Flor Caída de pétalos Fruto cuajado Raleo de frutos Crecimiento de frutos Pinta Pre-cosecha Post-cosecha

Enfermedades

Ácaros e insectos

Malezas

Cáncer bacterial	piraclostrobin ^{PROSC} 0,5 L/ha		piraclostrobin ^{PROSC} 0,5 L/ha								
Hongos de la madera		podaspec ^{PROSC}									
Reducir presión de enfermedades		polisulfuro ^{PROSL} CALCIO									
Tizón de la flor				boscalid ^{PROSC} 1,2 kg/ha miclobutanil ^{PROSL} 250 - 300 g/ha (solo <i>Monilia laxa</i>) piraclostrobin ^{PROSC} 0,5 L/ha tebuconazol ^{PROSC} 30 - 40 cc/100 L tebuconazol ^{PROSL} 50 - 100 g/100 L							
Cloca Corineo Monilia				clorotalonil ^{PROSC} 180 - 200 cc/100 L							
Oídio Tizón de la flor (<i>Monilia laxa</i>)				propiconazol ^{PROSC} 0,5 L/ha							
Oídio				miclobutanil ^{PROSL} 8 - 10 g/100 L	tebuconazol ^{PROSC} 20 - 35 cc/100 L	tebuconazol ^{PROSL} 40 - 60 g/100 L		Oídio y roya: sulfur ^{PROSL} 200 - 400 cc/100 L			
Botritis								boscalid ^{PROSC} 1,2 kg/ha			
Botritis Pudrición ácida								tebuconazol ^{PROSC} 60 - 70 cc/100 L tebuconazol ^{PROSL} 100 g/100 L			
Cuerudo				kresoxim ^{PROSC} METIL 13 cc/100 L (nectarino)							
Reducir presión de plagas		polisulfuro ^{PROSL} CALCIO									
Escama de San José		piriproxifen ^{PROSC} 50 - 70 cc/100 L									
Trips Eulia <i>Drosophila suzukii</i>				espinosad ^{PROSC} 12 cc/100 L (eulia y trips)							
Escama de San José Polillas Chanchitos blancos Trips de California Pulgones				acetamiprid ^{PROSL} 50 g/100 L	acetamiprid ^{PROSL} 15 g/100 L						
Polilla oriental Eulia				clorrantraniliprol ^{PROSC} 20 cc/100 L				metoxifenoimid ^{PROSC} 15 - 20 cc/100 L			
Polillas Pulgones Eulia Gusano de los penachos								lambda ^{PROSC} CBHALOTRINA 200 - 250 cc/ha			
Pulgones				imidacloprid ^{PROSL} 30 - 50 cc/100 L	imidacloprid ^{PROSL} 10 - 15 g/100 L						
Arañitas Trips								abamectin ^{PROSC} 80 - 100 cc/100 L			
Arañitas								espirodiclofen ^{PROSC} 50 - 60 cc/100 L			
Araña bimaclulada Burrito de la vid Enrollador de los frutales Polilla oriental Pulgón verde										bifentrin ^{PROSC} 60 cc/100 L	
Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin ^{PROSL} 200 - 300 g/ha	simazina ^{PROSL} 2 - 4 kg/ha									
Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin ^{PROSL} 50 - 100 g/ha									flumioxazin ^{PROSL} 50 - 100 g/ha	
Post-emergente: anuales y perennes				glifospec ^{PROSL}	glifospecplus ^{PROSL}					glifospec ^{PROSL}	glifospecplus ^{PROSL}
Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta											
				glifospec ^{PROSL} 2 - 7 L/ha	glifospecplus ^{PROSL} 1,1 - 4 kg/ha						
											cletidim ^{PROSL} 0,4 - 2 L/ha

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.

Esta información es de carácter referencial. Leer siempre la etiqueta antes de aplicar un producto.