

Programa fitosanitario **nogales**



	Receso invernal	Elongación de amentos	Floración	Cuaja	Crecimiento de frutos	Endurecimiento	Maduración	Apertura pelón	Post-cosecha
Enfermedades	Hongos de la madera	acierto ^{140EC} 75 cc/100 L fungifull ^{275SC} 100 cc/100 L podaspec			acierto ^{140EC} 75 cc/100 L				acierto ^{140EC} 75 cc/100 L fungifull ^{275SC} 100 cc/100 L
	Hongos de la madera Peste negra BAN				acierto ^{140EC} 75 cc/100 L (complementa las aplicaciones de cobre)				
	Peste negra Mayor rendimiento				piraclostrobin ^{250EC} 0,5 - 1 L/ha (complementa las aplicaciones de cobre)				
Ácaros e Insectos	Escama de San José	piriproxifen ^{100EC} 50 - 60 cc/100 L				acetamiprid ^{20%SP} 50 g/100 L acetamiprid ^{70%WP} 15 g/100 L			
	Arañitas			abamectin ^{18EC} 100 cc/100 L	bifentrin ^{100EC} 60 cc/100 L	espirodiclofen ^{240SC} 50 - 60 cc/100 L			
	Araña bimaclada Burrito Polilla de la manzana					bifentrin ^{100EC} 60 cc/100 L			
	Polilla de la manzana				acetamiprid ^{20%SP} 50 - 75 g/100 L clorantropiliprol ^{200SC} 20 cc/100 L tiacloprid ^{480SC} 20 cc/100 L	acetamiprid ^{70%WP} 15 g/100 L lambda ^{50EC} CIHALOTRINA 0,6 - 0,7 L/ha metoxifenoimid ^{240SC} 15 - 20 cc/100 L	bifentrin ^{100EC} 60 cc/100 L		
	Pulgón del nogal					acetamiprid ^{20%SP} 40 g/100 L acetamiprid ^{70%WP} 15 g/100 L			
	Polilla del algarrobo						acetamiprid ^{20%SP} 50 - 75 g/100 L metoxifenoimid ^{240SC} 15 - 20 cc/100 L	lambda ^{50EC} CIHALOTRINA 0,6 - 0,7 L/ha tiacloprid ^{480SC} 20 cc/100 L	
Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin ^{50%WP} 200 - 300 g/100 L simazina ^{90%WG} 2 - 4 kg/ha							
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin ^{50%WP} 50 - 100 g/ha glifospec ^{480SL} + glifospecplus ^{75%SG}						flumioxazin ^{50%WP} 50 - 100 g/ha glifospec ^{480SL} + glifospecplus ^{75%SG}	
	Post-emergente: anuales y perennes			glifospec ^{480SL} 2 - 7 L/ha ⁽¹⁾	glifospecplus ^{75%SG} 1,1 - 4 kg/ha ⁽¹⁾				
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta				cletodim ^{240EC} 0,4 - 2 L/ha				
Otros	Uniformar brotación	cianamida ^{500SL}							
	Protector solar					reflexsol ^{PLUS} 2 - 3 kg/100 L			

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.