


Programa fitosanitario **olivos**



		Post-cosecha	Latencia de otoño e invierno	Brotación	Floración	Cuaja	Crecimiento de frutos	Pre-cosecha
Enfermedades	Repilo	acierto^{140 EC} 75 cc/100 L fungifull^{275 SC} 65 cc/100 L kresoxim^{500 SC} METIL 13 cc/100 L						
		miclobutanil^{240 EC} 12 cc/100 L piraclostrobin^{250 EC} 0,5 L/ha stopil^{140 SC} 70 cc/100 L						
Ácaros e Insectos	Conchuela negra Escama blanca Mosquita blanca		piriproxifen^{100 EC} 50 - 70 cc/100 L					
	Chanchitos blancos Conchuela negra Escama blanca			acetamiprid^{70% WP} 15 g/100 L acetamiprid^{20% SP} 50 g/100 L (solo escama blanca) acetamiprid^{70% WP} 25 - 30 g/100 L imidacloprid^{70% WP} 25 - 30 g/100 L		acetamiprid^{70% WP} 15 g/100 L acetamiprid^{20% SP} 50 g/100 L (solo escama blanca) acetamiprid^{70% WP} 25 - 30 g/100 L imidacloprid^{70% WP} 25 - 30 g/100 L		
Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin^{50% WP} 200 - 300 g/ha	simazina^{90% WG} 2 - 4 kg/ha					
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin^{50% WP} 50 - 100 g/ha + glifospec^{480 SL} o glifospecplus^{75% SG}						
	Post-emergente: anuales y perennes	glifospec^{480 SL} 2 - 7 L/ha		glifospecplus^{75% SG} 1,1 - 4 kg/ha				
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta	cletodim^{240 EC} 0,4 - 2 L/ha						

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.

Esta información es de carácter referencial. Leer siempre la etiqueta antes de aplicar un producto.