

Programa fitosanitario **vid vinífera**



Vid vinífera		Caída de hojas	Receso invernal	Brotación		Floración		Crecimiento de bayas	Cierre de racimos	Pinta	Pre-cosecha	Cosecha	Post-cosecha	
Enfermedades	Hongos de la madera		tebuconazol 250 g/100 L 25% WP											
			fungi full 200 cc/100 L (aspersión) 75% SC podaspec											
	Reducir presión de enfermedades		polisulfuro CALCIO 350 SL											
	Oídio			400 FLO sulfur 300 - 400 cc/100 L 40% WP										
				acierto 75 cc/100 L 140 EC	difenoconazol 15 - 20 cc/100 L 250 EC	miclobutanil 7,5 g/100 L 40% WP	miclobutanil 12 cc/100 L 240 EC	stopil 70 cc/100 L 140 SC						
				fungi full 65 cc/100 L 75% SC	tebuconazol 25 g/100 L 25% WP	tebuconazol 25 cc/100 L 430 SC								
	Oídio Botritis			acierto 75 - 125 cc/100 L 140 EC			tebuconazol 120 g/100 L 25% WP	tebuconazol 60 - 70 cc/100 L 430 SC						
					boscalid 1,2 kg/ha 50% WG									
Oídio Botritis <i>Cladosporium</i> <i>Mildiú</i>			kresoxim METIL 500 SC											
Botritis					fusion espaldera: 1,3 L/ha mín. parronal: 2 L/ha mín. 425 SC					citrusdust 20 kg/ha				
Botritis Pudrición ácida										citrus 1 - 1,5 L/ha SL				
Ácaros e Insectos	Reducir presión de plagas		polisulfuro CALCIO 350 SL											
	Falsa araña roja de la vid Araña roja de la vid			abamectin 80 cc/100 L 18 EC										
				espiroclorfen 50 - 60 cc/100 L 240 SC				espiroclorfen 50 - 60 cc/100 L 240 SC						
	Eulia			lambda 0,15 - 0,25 L/ha 150 EC	metoxifenozid 150 cc/ha (15 - 20 cc/100 L) 240 SC									
	Burrito de la vid Chanchitos blancos Conchuela café Falsa araña roja de la vid Lobesia Taladrador de la vid			bifentrin 60 cc/100 L 100 EC									bifentrin 60 cc/100 L 100 EC	
	Chanchitos blancos Conchuelas			imidacloprid 80 - 100 cc/100 L 200 SL	imidacloprid 25 - 30 g/100 L (chanchitos blancos) 70% WP									
Lobesia			metoxifenozid 20 cc/100 L (1º generación) 240 SC		lambda 20 cc/100 L 150 EC									
Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin 200 - 300 g/ha 50% WP simazina 2 - 4 kg/ha 90% WG										flumioxazin 200 - 300 g/ha 50% WP simazina 2 - 4 kg/ha 90% WG		
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin 50 - 100 g/ha 50% WP + glifospec 2 - 7 L/ha 480 SL glifospec plus 75% SG												
	Post-emergente: anuales y perennes			glifospec 2 - 7 L/ha 480 SL (1)		glifospec plus 1,1 - 4 kg/ha 75% SG (1)								
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta			cletodim 0,4 - 2 L/ha 240 EC										

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.