



NOMBRE COMUN	Rizogen Plus	
INGREDIENTE ACTIVO	<i>Extracto de Ascophyllum nodosum</i> , carbono, potasio, nitrógeno, zinc y fósforo.	
FORMULACION	Líquido en solución	
COMPOSICION	% m/v	
	<i>Extracto de Ascophyllum nodosum</i>	35,0
	Carbono (C)	14,3
	Óxido de potasio (P ₂ O ₅)	6,2
	Nitrógeno ureico (N)	2,1
	Zinc (Zn)	1,6
	Pentóxido de fósforo (K ₂ O)	0,4

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Bioestimulante radicular, formulado a base de extracto de *Ascophyllum nodosum* y zinc, que aporta un 24,5% m/v de materia orgánica de origen vegetal. Su aplicación al suelo estimula el crecimiento radicular, aumentando la absorción de agua y nutrientes, mejora las condiciones físico-químicas del suelo y aumenta la tolerancia al estrés hídrico, térmico y salino. Además, contiene bioestimulantes que contribuyen a estimular el crecimiento vegetativo de las plantas (0,12% p/v de AIB).

Corrige deficiencias de zinc.

RECOMENDACIONES DE USO

Vía fertirriego

Cultivo	Dosis	Observaciones
Almendro, avellano europeo, castaño, ciruelo, cerezo, damasco, duraznero, kiwi, manzano, membrillero, nectarino y nogal.	2 - 3 L/ha/aplicación	Aplicar desde el inicio de actividad radicular. Aplicaciones por temporada frutales de hoja caduca: 3 máx. En frutales persistentes se pueden extender las aplicaciones hasta otoño. Intervalo entre aplicaciones: 30 días y/o al siguiente <i>flush</i> radicular, si fuera necesario.

Cultivo	Dosis	Observaciones
Peral, pistacho, vid de mesa, vid pisquera y vid vinífera.	2 - 3 L/ha/aplicación	Aplicar desde el inicio de actividad radicular. En frutales de hoja persistente se pueden extender las aplicaciones hasta otoño. Aplicaciones por temporada: - Frutales de hoja caduca y vides: 3 máx. - Frutales de hoja persistente: 4 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días y/o al siguiente <i>flush</i> radicular, si fuera necesario.
Arándano, cranberry, frambueso, frutilla, mora y zarzaparrilla.		
Clementino, limonero, mandarino, naranjo, olivo, palto, pomelo y tangelo.	2 - 4 L/ha/aplicación	
Ajo, bunching, cebolla, chalota, ciboulette, papa, puerro, remolacha y zanahoria.	1,5 - 3 L/ha/aplicación	Aplicar desde 15 a 20 días después del trasplante. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo entre aplicaciones: 20 a 30 días.
Acelga, achicoria, ají, apio, berenjena, brócoli, coliflor, espinaca, lechuga, melón, pepino, pimentón, rábano, repollito de bruselas, repollo, rúcula, sandía, tomate, zapallo y zapallo italiano.		
Avena, cebada, leguminosas de grano, oleaginosas, trigo y triticale.	1,5 - 3 L/ha/aplicación	Aplicar desde 2 a 5 hojas verdaderas. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 días.
Huertos en formación	1,5 - 3 L/ha/aplicación	Aplicar desde el inicio de actividad radicular. Aplicaciones por temporada: 2 a 4 máx. Intervalo entre aplicaciones: 30 a 45 días, si fuera necesario.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agregar lentamente el producto al estanque de fertirriego (en una concentración no mayor a 6 L/100 L de agua) y disolver en agua, agitando vigorosamente. Completar el volumen de agua necesario e inyectar al riego.
- Inyectar en la última etapa del riego para dejar el producto en la zona de mayor concentración de raíces.
- Cuando no sea posible aplicar vía riego tecnificado, aplicar vía *drench* a la base de las plantas, respetando las dosis/ha.
- En frutales y vides, se recomienda verificar el inicio del *flush* de crecimiento de raíces mediante calicatas.
- En casos especiales, consultar al Depto. Técnico de Agrospec.

INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

- No mezclar con productos de reacción ácida ni con productos que contengan polifosfatos. De preferencia, aplicar solo.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas.
- Es compatible con la mayoría de los productos agrícolas de uso común. Para mayor seguridad, realizar pruebas de compatibilidad previas a pequeña escala.