



<b>NOMBRE COMUN</b>	Nutra Brotación		
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	<i>Ascophyllum nodosum</i> , aminoácidos libres, potasio, magnesio, manganeso y zinc.		
<b>FORMULACION</b>	Concentrado soluble (SL)		
<b>COMPOSICION</b>		<b>% p/v</b>	<b>% p/p</b>
	Aminoácidos libres	7	5,8
	Potasio (K <sub>2</sub> O)	1,8	1,5
	Magnesio (MgO)	1,5	1,2
	Zinc (Zn)	1,0	0,8
	Manganeso (Mn)	0,3	0,2

## PRINCIPALES CARACTERISTICAS

**Nutra Brotación** es un bioestimulante y corrector foliar a base de algas (contiene 9% p/v de *Ascophyllum nodosum*), aminoácidos (L- $\alpha$ -aminoácidos), macro y micronutrientes. Está formulado especialmente para estimular el período de brotación de frutales y vides, promoviendo el crecimiento de brotes y la actividad de las plantas, incluso en condiciones de estrés, después de heladas y en otras condiciones ambientales desfavorables. En plantas nuevas, promueve el crecimiento durante toda la temporada.

**Nutra Brotación** se absorbe rápida y fácilmente por hojas, tallos y brotes.

## RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación foliar:

Cultivo	Dosis		Observaciones
	L/ha	cc/100 L	
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	3,5 - 5	350 - 500	Aplicar desde brotes de 5 a 10 cm, repitiendo si fuera necesario, cada 7 a 10 días. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.
Clementino Limonero Mandarino Naranja Pomelo	4 - 5	350 - 500	Aplicar al inicio de la brotación de otoño y primavera. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.
Almendro Avellano europeo Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero	3,5 - 5	350 - 500	Aplicar en brotación, repitiendo si fuera necesario, cada 7 a 10 días. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.

Cultivo	Dosis		Observaciones
	L/ha	cc/100 L	
Kiwi Manzano Nectarino Nogal Olivo Peral	3,5 - 5	350 - 500	Aplicar en brotación, repitiendo si fuera necesario, cada 7 a 10 días. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.
Arándano Frambueso Frutilla	3 - 4	350 - 500	Aplicar en brotación, repitiendo si fuera necesario, cada 7 a 10 días. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.
Pimentón Tomate	1 - 4	350 - 500	Aplicar desde el trasplante, repitiendo si fuera necesario, cada 7 a 10 días. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.
Huertos en formación	1 - 4	350 - 500	Aplicar desde brotación hasta mediados del verano, cada 7 a 10 días, mientras se requiera estimular el crecimiento vegetativo.

El n° de aplicaciones (1 a 3 por temporada) dependerá de las condiciones ambientales y del huerto.

## INSTRUCCIONES DE USO

Agregar al estanque del equipo aplicador a medio llenar, con el agitador funcionando. Completar el estanque con agua.

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

## COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. En caso de dudas, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad en pequeña escala.