

AMIN 15

Lote N°:

Fecha fabric./Fecha venc.:

Bioestimulante no microbiano

Líquido en solución

Composición	% m/v
Materia seca (%m/m)	17,8
Aminoácidos libres (L- α - aminoácidos)	15,0
Carbono (C)	5,8
Nitrógeno total (N)	2,4

Contaminantes	ppm
Arsénico	< 0,5
Cadmio	< 0,5
Cobre	< 10
Cromo VI	< 2
Mercurio	< 0,5
Níquel	< 10
Plomo	< 0,5
Zinc	< 10
<i>Escherichia coli</i>	ausente
<i>Salmonella</i> sp.	ausente

Parámetros fisicoquímicos	
Densidad (a 20°C)	1,06 g/mL
pH (10% a 20°C)	4,2

Fabricado por

agrospec

Camino El Milagro 257, Maipú. Santiago, Chile.

agrospec.cl

Contenido neto:

Principales características

Bioestimulante foliar y para fertirriego, constituido por aminoácidos libres (L- α - aminoácidos) de origen vegetal, que aporta un 9,9 % m/v de materia orgánica. Las plantas pueden utilizar estos aminoácidos en forma inmediata para promover el desarrollo vegetativo, la floración, la cuaja y el crecimiento de frutos. En condiciones de estrés abiótico, su aporte energético contribuye a mantener las plantas en activo crecimiento y sus compuestos ayudan a detoxificar los agentes que limitan su recuperación.

Recomendaciones de uso vía foliar y fertirriego

Cultivo	Dosis		Observaciones*
	Foliar	Fertirriego	
Almendro, arándano, avellano europeo, castaño, cerezo, ciruelo, clementino, cranberry, damasco, duraznero, frambueso, frutilla, limonero, mandarino, manzano, membrillero, mora, naranjo, nectarino, nogal, olivo, palto, peral, pistacho, pomelo, tangelo, vid de mesa, vid pisquera, vid vinífera y zarzaparrilla.	2 - 4 L/ha	3 - 4 L/ha	Aplicar periódicamente cuando se requiera mantener la planta activa bajo condiciones de estrés abiótico, incluso en postcosecha temprana (con hojas activas).
Kiwi		2 - 4 L/ha	Aplicar durante brotación, floración, fruto recién cuajado y hasta 14 días después. Si los frutos tienen presencia de polvo, preferir aplicaciones vía fertirriego.
Papa	1,5 - 4 L/ha	1,5 - 4 L/ha	Aplicar 7 a 10 días después del trasplante y durante el desarrollo del cultivo.
Acelga, achicoria, ajo, apio, brócoli, bunching, cebolla, cebollín, chalota, ciboulette, coliflor, espinaca, lechuga, puerro, rabanito, rábano, repolito de brúselas, repollo y rúcula.			
Ají, berenjena, pimentón y tomate.			
Melón, pepino, sandía, zapallo y zapallo italiano.			Aplicar en macolla y/o en formación de espiga y floración.
Avena, cebada, trigo y triticale.			Aplicar 7 a 10 días postrasplante y repetir durante el desarrollo del cultivo.
Betarraga, rábano, remolacha y zanahoria.			Aplicar con 2 a 3 hojas y repetir durante el desarrollo del cultivo.
Leguminosas de grano, maíz y oleaginosas.			Aplicar con 6 a 10 cm y repetir 7 a 10 días después del corte.
Alfalfa y praderas.			
Huertos en formación y viveros.		2 - 3 L/ha	Aplicar periódicamente cuando se requiera mantener a la planta activa bajo condiciones de estrés abiótico.
Ornamentales		4 - 6 L/ha	

* **aplicaciones por temporada:** realizar 2 a 6 aplicaciones foliares o vía fertirriego por temporada, según las condiciones de estrés a las que esté sometido el cultivo y la necesidad de favorecer el crecimiento vegetativo o de los frutos. En el caso de ornamentales, aplicar 3 a 4 veces por temporada.

* **intervalo entre aplicaciones:** para todos los cultivos, repetir cada 15 a 30 días.

Instrucciones de uso

- Para aplicaciones foliares, utilizar solo o en mezcla con fertilizantes foliares y fitosanitarios de uso común.
- Para aplicaciones al suelo vía fertirriego, usar con actividad radicalar. Aplicar preferentemente solo, en caso de mezclar, realizar pruebas de compatibilidad.
- En aplicaciones foliares, **Amin 15** podría aumentar la absorción de productos acompañantes en la mezcla.

Incompatibilidad

- No aplicar en mezcla con derivados cúpricos, aceites minerales ni azufre.
- Es compatible con la mayoría de los productos agrícolas de uso común. Para mayor seguridad, realizar pruebas de compatibilidad previas a pequeña escala.

Precauciones

- Producto no tóxico, sin embargo, usar medidas de protección propias del manejo de un fitosanitario. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipo de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
- Condiciones de almacenamiento: conservar en una bodega seca, fresca y ventilada, protegido de la luz solar directa, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta.