



NOMBRE	Amin 15	
INGREDIENTE ACTIVO	Aminoácidos libres (<i>L-α-aminoácidos</i>) de origen vegetal.	
FORMULACION	Líquido en solución	
COMPOSICION	Aminoácidos libres (<i>L-α-aminoácidos</i>)	% m/v 15,0
	Carbono (C)	5,8
	Nitrógeno total (N)	2,4

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Amin 15 es un bioestimulante foliar y para fertirriego, constituido por aminoácidos libres (*L-α-aminoácidos*) de origen vegetal, que aporta un 9,9 % m/v de materia orgánica. Las plantas pueden utilizar estos aminoácidos en forma inmediata para promover el desarrollo vegetativo, la floración, la cuaja y el crecimiento de los frutos. En condiciones de estrés abiótico, su aporte energético contribuye a mantener las plantas en activo crecimiento y sus compuestos ayudan a detoxificar los agentes que limitan su recuperación.

RECOMENDACIONES DE USO

Vía foliar y fertirriego

Cultivo	Dosis		Observaciones*
	Foliar	Fertirriego	
Almendro, arándano, avellano europeo, castaño, cerezo, ciruelo, clementino, cranberry, damasco, duraznero, frambueso, frutilla, limonero, mandarino, manzano, membrillero, mora, naranjo, nectarino, nogal, olivo, palto, peral, pistacho, pomelo, tangelo vid de mesa, vid pisquera, vid vinífera y zarparilla.	2 - 4 L/ha	3 - 4 L/ha	Aplicar periódicamente, cuando se requiera mantener la planta activa, bajo condiciones de estrés abiótico e incluso en postcosecha temprana (con hojas activas).
Kiwi	2 - 4 L/ha	2 - 4 L/ha	Aplicar durante la brotación, floración, fruto recién cuajado y hasta 14 días después. Si los frutos tienen presencia de polvo, preferir aplicaciones vía fertirriego.

Cultivo	Dosis		Observaciones*
	Foliar	Fertirriego	
Papa	1,5 - 4 L/ha	1,5 - 4 L/ha	Aplicar 7 a 10 días después del trasplante y durante el desarrollo del cultivo.
Acelga, achicoria, ajo, apio, brócoli, bunching, cebolla, cebollín, chalota, ciboulette coliflor, espinaca, lechuga, puerro rabanito, rábano, repollito de bruselas, repollo y rúcula.			
Ají, berenjena, pimentón y tomate.			
Melón, pepino, sandía, zapallo y zapallo italiano.			
Avena, cebada, trigo y triticale.			Aplicar en macolla y/o en formación de espiga y floración.
Betarraga, rábano, remolacha y zanahoria.			Aplicar 7 a 10 días postrasplante y repetir durante el desarrollo del cultivo.
Leguminosas de grano, maíz y oleaginosas.			Aplicar con 2 a 3 hojas y repetir durante el desarrollo del cultivo.
Alfalfa y praderas.		2 - 3 L/ha	Aplicar con 6 a 10 cm y repetir 7 a 10 días después del corte.
Huertos en formación y viveros			Aplicar periódicamente cuando se requiera mantener a la planta activa bajo condiciones de estrés abiótico.
Ornamentales		4 - 6 L/ha	

* **aplicaciones por temporada:** realizar 2 a 6 aplicaciones foliares o vía fertirriego por temporada, según las condiciones de estrés a las que esté sometido el cultivo y la necesidad de favorecer el crecimiento vegetativo o de los frutos. En el caso de ornamentales, aplicar 3 a 4 veces por temporada.

* **intervalo entre aplicaciones:** para todos los cultivos, repetir cada 15 a 30 días.

INSTRUCCIONES DE USO

- Para aplicaciones foliares, utilizar solo o en mezcla con fertilizantes foliares y fitosanitarios de uso común.
- Para aplicaciones al suelo vía fertirriego, aplicar con actividad radicular. Aplicar preferentemente solo, en caso de mezclar, realizar pruebas de compatibilidad.
- En aplicaciones foliares, podría aumentar la absorción de productos acompañantes en la mezcla.

INCOMPATIBILIDAD

- No aplicar en mezcla con derivados cúpricos, aceites minerales ni azufre.
- Es compatible con la mayoría de los productos agrícolas de uso común. Para mayor seguridad, realizar pruebas de compatibilidad previas a pequeña escala.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas.