

Programa fitosanitario avellanos



Avellanos

Ácaros e Insectos

Malezas

	Caída de hojas	Receso invernal	Brotación	Floración	Crecimiento de frutos	Pre-cosecha	Post-cosecha
Estados invernales de arañas Chanchitos blancos Escama de San José		polisulfuro ^{350SL} CALCIO					
Burrito del frambueso				lambda ^{50EC} CIHALOTRINA 20 - 30 cc/100 L			
Pulgón del avellano					acetamiprid ^{70% WP} 12 - 15 g/100 L acetamiprid ^{20% SP} foliar: 50 - 75 g/100 L al suelo: 1,5 - 3 kg/ha juno ^{45% WP} 20 g/100 L		
Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta		flumioxazin ^{50% WP} 200 - 300 g/ha					
Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta		flumioxazin ^{50% WP} 50 - 100 g/ha + glifospec ^{480 SL} o glifospecplus ^{75% SG}					
Post-emergente: anuales y perennes			glifospec ^{480 SL} 2 - 7 L/ha		glifospecplus ^{75% SG} 1,1 - 4 kg/ha		
Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta				cletodim ^{240EC} 0,4 - 2 L/ha			

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.

Información de carácter referencial. Lea siempre la etiqueta antes de aplicar un producto.