

Programa fitosanitario **ciruelos**



	Previo a caída de hojas	Receso invernal	Yema hinchada	Floración	Caída de pétalos	Fruto cuajado	Crecimiento de frutos	Pre-cosecha	Post-cosecha
Enfermedades	Cáncer bacterial	piraclostrobin ^{50%} 0,5 L/ha		piraclostrobin ^{50%} 0,5 L/ha					
	Cortes de poda		podaspec [®] (no utilizar en ciruelos con cosecha mecanizada)						
	Reducir presión de enfermedades		polisulfuro ^{30%} CALCIO						
	Tizón de la flor (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilia</i> spp.)			piraclostrobin ^{50%} 0,5 L/ha tebuconazol ^{40%} 40 cc/100 L					
	Tizón de la flor (<i>Monilia</i> spp.)			propiconazol ^{20%} 0,5 L/ha					
	Botritis			boscalid ^{50%} 1,2 kg/ha				boscalid ^{50%} 1,2 kg/ha	
	Roya					propiconazol ^{20%} 0,5 L/ha			
	Cuerudo (complejo de hongos asociado al russet de frutos)					sulfur ^{60%} PLO 200 - 400 cc/100 L			
	Botritis Pudrición ácida					kresoxim ^{50%} METIL 13 cc/100 L			tebuconazol ^{40%} 60 - 70 cc/100 L
Ácaros e Insectos	Reducir presión de plagas		polisulfuro ^{30%} CALCIO						
	Escama de San José		piriproxifen ^{20%} 50 - 60 cc/100 L						
	Arañitas Trips					abamectin ^{15%} 80 - 100 cc/100 L			
	Polilla oriental Eulia Gusano de los penachos					clorraniliprol ^{20%} 20 cc/100 L (excepto gusano de los penachos) (en proceso de registro)		metoxifenozid ^{50%} 15 - 20 cc/100 L	
	Lobesia					acetamiprid ^{20%} SP 50 g/100 L acetamiprid ^{20%} WP 15 g/100 L lambda ^{50%} CHALOTRINA 20 cc/100 L metoxifenozid ^{50%} 20 cc/100 L			
	Polilla oriental Eulia Pulgones Gusano de los penachos					lambda ^{50%} CHALOTRINA 200 - 250 cc/ha			lambda ^{50%} CHALOTRINA 200 - 250 cc/ha
	Chanchitos blancos Pulgones					imidacloprid ^{20%} 80 - 100 cc/100 L imidacloprid ^{20%} 10 - 15 g/100 L (solo pulgones)			
	Arañitas						espirodiclofen ^{24%} 50 - 60 cc/100 L		
	Escama de San José Polilla oriental Trips californiano Pulgones <i>Drosophila suzukii</i>						acetamiprid ^{20%} SP 50 g/100 L acetamiprid ^{20%} WP 15 g/100 L (también controla chanchitos blancos)		acetamiprid ^{20%} SP 50 g/100 L acetamiprid ^{20%} WP 15 g/100 L (también controla chanchitos blancos)
	Araña bimaclada Polilla oriental Enrollador de los frutales Pulgón verde								bifentrin ^{20%} araña bimaclada: 60 cc/100 L
Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta		flumioxazin ^{50%} WP 200 - 300 g/ha						
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta		flumioxazin ^{50%} WP 50 - 100 g/ha + glifospec ^{480 SL} o glifospecplus ^{75% SG}						flumioxazin ^{50%} WP 50 - 100 g/ha + glifospec ^{480 SL} o glifospecplus ^{75% SG}
	Post-emergente: anuales y perennes			glifospec ^{480 SL} (1) 2 - 7 L/ha		glifospecplus ^{75% SG} (1) 1,1 - 4 kg/ha			
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta				cletodim ^{240%} 0,4 - 2 L/ha				

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.