

Programa fitosanitario cítricos



Cítricos

	Post-cosecha	Brotación	Inicio floración	Floración	Fruto cuajado	Crecimiento de frutos	Pinta	Pre-cosecha	Cosecha
Enfermedades	Phytophthora (extirpación de canchros)	podaspec							
	Oídio (mandarinos)			acierto ^{140EC} 75 cc/100 L		difenoconazol ^{250EC} 20 cc/100 L			
Ácaros e insectos	Arañitas		abamectin ^{18EC} 75 cc/100 L			abamectin ^{18EC} 75 cc/100 L			
					bifentrin ^{100EC} 50 cc/100 L				
						espirodiclofen ^{240SC} 50 - 60 cc/100 L			
	Escama roja Mosquitas blancas Conchuela negra				piriproxifen ^{100EC} 30 - 50 cc/100 L escama roja: 60 cc/100 L				
	Escama roja Chanchitos blancos Mosquitas blancas Pulgones		acetamiprid ^{20%SP} 50 g/100 L			acetamiprid ^{20%SP} 50 g/100 L			
	Chanchitos blancos Mosquitas blancas Pulgones		acetamiprid ^{70%WP} 15 g/100 L			acetamiprid ^{70%WP} 15 g/100 L	acetamiprid ^{20%SP} 80 - 100 cc/100 L (pulgones: 30 - 50 cc/100 L)		
Chanchitos blancos Conchuelas Escamas Mosquitas blancas Pulgones Trips					imidacloprid ^{70%WP} 25 - 30 g/100 L pulgones y mosquitas: 10 - 15 g/100 L	imidacloprid ^{200SL} mosquita blanca y chanchitos blancos: 80 - 100 cc/100 L pulgones: 30 - 50 cc/100 L			
Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin ^{50%WP} 200 - 300 g/ha							
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin ^{50%WP} 50 - 100 g/ha +							
		glifospec ^{480SL} o glifospecplus ^{75%SG}							
	Post-emergente: anuales y perennes			glifospec ^{480SL} 2 - 7 L/ha		glifospecplus ^{75%SG} 1,1 - 4 kg/ha			
					cletodim ^{240EC} 0,4 - 2 L/ha				
Otros						reflexsol ^{PLUS} 15 - 50 kg/ha			

(1): las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.