

Programa fitosanitario
durazneros • nectarinos



Durazneros Nectarinos

	Previo caída de hojas	Receso invernal	Yema hinchada	Flor	Caída de pétalos	Fruto cuajado	Raleo de frutos	Crecimiento de frutos	Pinta	Pre-cosecha	Post-cosecha
Enfermedades	Cáncer bacterial	piraclostrobin ^{PROPEC} 0,5 L/ha		piraclostrobin ^{PROPEC} 0,5 L/ha							
	Hongos de la madera		podaspec ^{PROPEC}								
	Reducir presión de enfermedades		polisulfuro ^{PROPEC} CALCIO								
	Tizón de la flor			boscalid ^{PROPEC} 1,2 kg/ha miclobutanil ^{PROPEC} 250 - 300 g/ha (solo <i>Monilia laxa</i>) piraclostrobin ^{PROPEC} 0,5 L/ha tebuconazol ^{PROPEC} 30 - 40 cc/100 L tebuconazol ^{PROPEC} 50 - 100 g/100 L							
	Cloca Corineo Monilia			clorotalonil ^{PROPEC} 180 - 200 cc/100 L							
	Oídio Tizón de la flor (<i>Monilia laxa</i>)			propiconazol ^{PROPEC} 0,5 L/ha							
	Oídio			miclobutanil ^{PROPEC} 8 - 10 g/100 L	tebuconazol ^{PROPEC} 20 - 35 cc/100 L	tebuconazol ^{PROPEC} 40 - 60 g/100 L		Oídio y roya: sulfur ^{PROPEC} 200 - 400 cc/100 L			
	Botritis								boscalid ^{PROPEC} 1,2 kg/ha		
	Botritis Pudrición ácida								tebuconazol ^{PROPEC} 60 - 70 cc/100 L tebuconazol ^{PROPEC} 100 g/100 L		
	Cuerudo				kresoxim ^{PROPEC} METIL 13 cc/100 L (nectarino)						
Ácaros e insectos	Reducir presión de plagas		polisulfuro ^{PROPEC} CALCIO								
	Escama de San José		piriproxifen ^{PROPEC} 50 - 70 cc/100 L								
	Escama de San José Polillas Chanchitos blancos Trips californiano Pulgones				acetamiprid ^{PROPEC} 50 g/100 L	acetamiprid ^{PROPEC} 15 g/100 L					
	Polilla oriental Eulia				clorraniliprol ^{PROPEC} 20 cc/100 L (en proceso de registro)			metoxifenoimid ^{PROPEC} 15 - 20 cc/100 L			
	Polillas Pulgones Eulia Gusano de los penachos							lambda ^{PROPEC} CHALOTRINA 200 - 250 cc/ha			
	Pulgones				imidacloprid ^{PROPEC} 30 - 50 cc/100 L	imidacloprid ^{PROPEC} 10 - 15 g/100 L					
	Arañitas Trips							abamectin ^{PROPEC} 80 - 100 cc/100 L			
	Arañitas							espirociclofen ^{PROPEC} 50 - 60 cc/100 L			
	Araña bimatulada Enrollador de los frutales Polilla oriental Pulgón verde										bifenitrol ^{PROPEC} araña bimatulada: 60 cc/100 L
	Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin ^{PROPEC} 200 - 300 g/ha								
Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta		flumioxazin ^{PROPEC} 50 - 100 g/ha + glifospec ^{PROPEC} 480 SL o glifospecplus ^{PROPEC} 75% SG									flumioxazin ^{PROPEC} 50 - 100 g/ha + glifospec ^{PROPEC} 480 SL o glifospecplus ^{PROPEC} 75% SG
Post-emergente: anuales y perennes				glifospec ^{PROPEC} 480 SL 2 - 7 L/ha ⁽¹⁾		glifospecplus ^{PROPEC} 75% SG 1,1 - 4 kg/ha ⁽¹⁾					
Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta					cletodim ^{PROPEC} 0,4 - 2 L/ha						

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.

Esta información es de carácter referencial. Leer siempre la etiqueta antes de aplicar un producto.