


# Programa fitosanitario **kiwis**



	Caída de hojas	Receso invernal	Brotación	Botón floral	Plena flor	Cuaja	Crecimiento de frutos	Pre-cosecha	Post-cosecha
Enfermedades		<p>podaspec</p> <p>polisulfuro<sup>350 SL</sup> CALCIO</p>							
Ácaros e Insectos	Falsa araña roja Eulia		<p>bifentrin<sup>100 EC</sup> 60 cc/100 L</p>						
	Eulia		<p>lambda<sup>50 EC</sup> CIHALOTRINA 0,2 - 0,25 L/ha</p>						
	Arañitas		<p>abamectin<sup>18 EC</sup>    espirodiclofen<sup>240 SC</sup> 60 - 100 cc/100 L    50 - 60 cc/100 L</p>						
Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	<p>flumioxazin<sup>50% WP</sup> 200 - 300 g/ha</p>							
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta	<p>flumioxazin<sup>50% WP</sup> 50 - 100 g/ha + glifospec<sup>480 SL</sup>    glifospecplus<sup>75% SG</sup></p>						<p>flumioxazin<sup>50% WP</sup> 50 - 100 g/ha + glifospec<sup>480 SL</sup>    glifospecplus<sup>75% SG</sup></p>	
	Post-emergente: anuales y perennes		<p>glifospec<sup>480 SL</sup> <sup>(1)</sup> 2 - 7 L/ha</p>		<p>glifospecplus<sup>75% SG</sup> <sup>(1)</sup> 1,1 - 4 kg/ha</p>				
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta			<p>cletodim<sup>240 EC</sup> 0,4 - 2 L/ha</p>					
Otros	Uniformar brotación	<p>cianamida<sup>500 SL</sup></p>							

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.

Esta información es de carácter referencial. Leer siempre la etiqueta antes de aplicar un producto.