


Programa fitosanitario **olivos**



	Post-cosecha	Latencia de otoño e invierno	Brotación	Floración	Cuaja	Crecimiento de frutos	Pre-cosecha	
Enfermedades	Repilo	acierto ^{140EC} 75 cc/100 L fungifull ^{275SC} 65 cc/100 L kresoxim ^{500SC} 13 cc/100 L METIL miclobutanil ^{240EC} 12 cc/100 L piraclostrobin ^{250EC} 0,5 L/ha stopil ^{140SC} 70 cc/100 L						
	Conchuela negra Escama blanca Mosquita blanca		piriproxifen ^{100EC} 50 - 70 cc/100 L					
Ácaros e Insectos	Chanchitos blancos Conchuela negra Escama blanca			acetamiprid ^{70% WP} 15 g/100 L acetamiprid ^{20% SP} acetamiprid ^{70% WP} 50 g/100 L (solo escama blanca) 25 - 30 g/100 L imidacloprid ^{70% WP} 25 - 30 g/100 L		acetamiprid ^{70% WP} 15 g/100 L acetamiprid ^{20% SP} acetamiprid ^{70% WP} 50 g/100 L (solo escama blanca) 25 - 30 g/100 L imidacloprid ^{70% WP} 25 - 30 g/100 L		
	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin ^{50% WP} 200 - 300 g/ha flumioxazin ^{50% WP} 50 - 100 g/ha + glifospec ^{480 SL} o glifospecplus ^{75% SG}						
Malezas	Post-emergente: anuales y perennes Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta		glifospec ^{480 SL} (1) 2 - 7 L/ha		glifospecplus ^{75% SG} (1) 1,1 - 4 kg/ha			

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.

Esta información es de carácter referencial. Leer siempre la etiqueta antes de aplicar un producto.