PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: hidrogenocarbonato de potasio, pertenece al grupo de las sales inorgánicas.
Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel, nunca manipular sin contar con los elementos de seguridad mínimos. La manipulación del producto debe ser sólo por personas adultas y entrenadas en su manejo. No comer, beber ni fumar durante la preparación y aplicación del producto.
Equipo de protección personal durante la preparación y aplicación del producto: usar máscara con filtro para polvos, buzo tipo *tyvek* impermeable, guantes impermeables, botas de goma y antiparras. No aplicar en contra del viento. Una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos ni pastos. Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas ni forrajes.
Información ecotoxicológica: a la dosis de aplicación recomendada, **Fungi-K 82% SP** es prácticamente no tóxico para aves, peces, algas y daphnias, ligeramente tóxico para lombrices y **VIRTUALMENTE NO TÓXICO PARA ABEJAS**.
Síntomas de intoxicación: nocivo si se inhala. Puede producir mareos, diarrea, náuseas e irritación de las vías respiratorias si se inhala.
Antídoto: no existe antídoto específico.
Tratamiento médico de emergencia: realizar tratamiento sintomático.
Primeros auxilios:
En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Si el afectado no respira, dar respiración artificial con máscara de respiración artificial. Trasladar al afectado a un centro asistencial inmediatamente. Llevar la etiqueta o el envase.
En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre el pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En caso de presentar reacción cutánea alérgica, llevar inmediatamente a un centro asistencial.
En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. No volver a utilizar los lentes de contacto
En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Trasladar al afectado a un centro asistencial inmediatamente. Llevar la etiqueta o el envase.
En todos los casos, trasladar al afectado inmediatamente a un centro asistencial. Llevar la etiqueta o el envase del producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

En caso de intoxicación llamar:
Centro Información Toxicológica UC (CITUC): (56-2) 2 635 38 00 (24 horas)
Agrospec S.A.: (56-2) 2 836 8000

v03112025

FUNGI-K 82% SP

Fungicida
Polvo soluble (SP)

Fungi-K 82% SP es un fungicida que actúa por contacto, recomendado para el control preventivo y curativo de oídio (*Uncinula necator, Podosphaera leucotricha, Sphaeroteca pannosa, Erysiphe polygoni, Leveillula taurica*), pudrición ácida (*Geotrichum candidum*) y botritis (*Botrytis cinerea*) en vides, frutales y hortalizas.

COMPOSICION:

Ingrediente Activo:	**% p/p**
Hidrogenocarbonato de potasio	82% (820 g/kg)
Coformulantes c.s.p.	100% (1 kg)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 20050

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote Nº:

Cont. Neto: kg. *Fecha Venc.:*

Fabricado y distribuido por:

Agrospec®

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción: Fungi-K 82% SP es un fungicida que actúa por contacto, recomendado para el control preventivo y curativo de oídio (*Uncinula necator, Podosphaera leucotricha, Sphaeroteca pannosa, Erysiphe polygoni, Leveillula taurica*), pudrición ácida (*Geotrichum candidum*) y botritis (*Botrytis cinerea*) en vides, frutales y hortalizas. Su modo de acción está relacionado con la presión osmótica, el pH y los efectos específicos de iones de bicarbonato/carbonato.

Equipo de aplicación: aspersión o nebulizadores.

Preparación de la mezcla: llenar con agua hasta la mitad del estanque del equipo aplicador y agregar lentamente la cantidad recomendada de **Fungi-K 82% SP**. Luego, completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo una agitación constante. Aplicar inmediatamente.

Cuadro de instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	Oídio (*Uncinula necator*)	150 - 250 g/100 L (espaldera: mín. 1 kg/ha parronal: mín. 2,5 kg/ha)	Aplicar desde yema algodonosa a pinta*. Aplicaciones por temporada: 6 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: -Parronal: 1.500 L/ha. -Espaldera: 400 - 1200 L/ha.	NC
Vid de mesa (parronal)	Botritis (*Botrytis cinerea*)	3,75 kg/ha	Aplicar desde pinta a precosecha*. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Aplicar con equipos de bajo volumen o ultra bajo volumen, o usar volumen menor a 750 L/ha con gota fina. Mojamiento sugerido equipo de ultra bajo volumen: 80 L/ha.	NC
Vid pisquera Vid vinífera (espaldera)		350 g/100 L (mín. 2,8 kg/ha)	Aplicar desde pinta a precosecha*. Aplicaciones por temporada: 5. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 800 - 1.000 L/ha	NC
Manzano	Oídio (*Podosphaera leucotricha*)	250 g/100 L	Aplicar desde cuaja en adelante*. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha. Asegurar un buen mojamiento del follaje, flores y frutos.	NC
Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero Nectarino	Oídio (*Sphaeroteca pannosa*)	200 g/100 L (mín. 3 kg/ha)	Aplicar desde caída de pétalos a precosecha*. Aplicaciones por temporada: 5. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha. Asegurar un buen mojamiento del follaje, flores y frutos.	NC
	Botritis (*Botrytis cinerea*) Pudrición ácida (*Geotrichum candidum*)	350 g/100 L	Aplicar desde pinta a precosecha*. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 1.000 a 1.200 L de agua/ha. Asegurar un buen mojamiento del follaje, flores y frutos.	NC
Frambueso Frutilla	Botritis (*Botrytis cinerea*)	350 g/100 L (2,1 - 2,8 kg/ha)	Aplicar desde inicio de flor a precosecha*. Aplicaciones por temporada: 4 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 600 - 800 L/ha. Asegurar un buen mojamiento del follaje, flores y frutos.	NC
Arándano		350 g/100 L (2,1 - 3,5 kg/ha)	Aplicar desde inicio de flor a precosecha*. Aplicaciones por temporada: 4 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 600 - 1.000 L/ha. Asegurar un buen mojamiento del follaje, flores y frutos.	NC
Ají Berenjena Pepino dulce Pimentón Tomate aire libre Tomate invernadero	Oídio (*Erysiphe polygoni, Leveillula taurica*) Botritis (*Botrytis cinerea*)	250 - 400 g/100 L (mín. 2 kg/ha)	Aplicar preventivamente en periodos críticos. Aplicaciones por temporada: - 8 a 12 para oídio. - 4 a 6 para botritis. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 500 - 1.000 L/ha, según estado de desarrollo del cultivo. Asegurar un buen mojamiento del follaje, flores y frutos.	NC

NC: No corresponde
*: cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Los mejores resultados se logran con un programa preventivo de aplicaciones. En caso de control curativo con condiciones propicias para el desarrollo de la enfermedad, usar los intervalos de aplicación menores.

Precauciones:
- Alternar las aplicaciones con fungicidas de otros grupos químicos (IRAC) o distinto modo de acción.
- No aplicar con temperaturas superiores a 25°C.
- Respetar las indicaciones de mojamiento y dosis máxima para aplicaciones en vides de mesa ya que se pueden generar depósitos en las bayas, afectando su condición final.
- Para aplicar **Fungi K 82% SP**, esperar mínimo 3 días si existió un tratamiento anterior y esperar mínimo 3 días para la aplicar otro producto.
- **Fungi K 82% SP** es altamente soluble en agua, no aplicar cuando se espera lluvia.
- Evitar la deriva por viento sobre cultivos vecinos.
- Utilizar siempre las concentraciones mayores para los menores volúmenes de agua.
- **Fungi K 82% SP** es un producto higroscópico, capaz de absorber humedad del medio. Mantener el envase bien cerrado y evitar almacenar en lugares húmedos, pues las características del producto y su desempeño en el campo se pueden ver afectados.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

Incompatibilidad: no se registraron incompatibilidades en pruebas específicas realizadas. Sin embargo, se recomienda no aplicar con productos sensibles a la degradación alcalina.

Fitotoxicidad: no presenta fitotoxicidad si se utiliza de acuerdo con la forma y dosis indicadas. Evitar la deriva del producto en condiciones ventosas.

Tiempo de reingreso: para personas, no ingresar al área tratada hasta después de 12 horas de la aplicación, asegurando que la aspersión se haya secado sobre la superficie de los cultivos tratados. Para animales, no corresponde indicar tiempo de reingreso al área tratada, por tratarse de cultivos cuya producción no está destinada al consumo animal.

Nota del fabricante: el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

USO EXCLUSIVO SAG

CUIDADO