



NOMBRE COMUN	Fungi•K 82% SP®
INGREDIENTE ACTIVO	Hidrogenocarbonato de potasio
GRUPO QUIMICO	Sales inorgánicas
FORMULACION	Polvo soluble (SP)
COMPOSICION	Hidrogenocarbonato de potasio 82% p/p (820 g/kg) Coformulantes c.s.p. 100% p/p (1 kg)
MODO DE ACCION	Acción de contacto, preventivo y curativo.
TOXICIDAD	Grupo IV, productos que normalmente no ofrecen peligro.
AUTORIZACION SAG	20050

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Fungi•K 82% SP es un fungicida que actúa por contacto, recomendado para el control preventivo y curativo de oídio (*Uncinula necator*, *Podosphaera leucotricha*, *Sphaeroteca pannosa*, *Erysiphe polygoni*, *Leveillula taurica*), pudrición ácida (*Geotrichum candidum*) y botritis (*Botrytis cinerea*) en vides, frutales y hortalizas.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones*	Carencia (días)
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	Oídio (<i>Uncinula necator</i>)	150 - 250 g/100 L (espaldera: mín. 1 kg/ha parronal: mín. 2,5 kg/ha)	Aplicar desde yema algodonosa a pinta*. Aplicaciones por temporada: 6 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: -Parronal: 1.500 L/ha. -Espaldera: 400 - 1200 L/ha.	NC
Vid de mesa	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	3,75 kg/ha	Aplicar preventivamente. Utilizar la dosis menor cuando se use en mezcla con otros fungicidas y la dosis mayor si se utiliza solo. Aplicaciones por temporada: 3 máx., Intervalo entre aplicaciones: 10 a 15 días. Mojamiento sugerido: 400 - 800 L/ha. según desarrollo del cultivo.	NC
Vid pisquera Vid vinífera		350 g/100 L (mín. 2,8 kg/ha)	Aplicar desde pinta a precosecha*. Aplicaciones por temporada: 5. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 800 - 1.000 L/ha	NC
Manzano	Oídio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	250 g/100 L	Aplicar desde cuaja en adelante*. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	NC
Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero Nectarino	Oídio (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	200 g/100 L (mín. 3 kg/ha)	Aplicar desde caída de pétalos a precosecha*. Aplicaciones por temporada: 5. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.	NC
	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>) Pudrición ácida (<i>Geotrichum candidum</i>)	350 g/100 L	Aplicar desde pinta a precosecha*. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 1.000 a 1.200 L de agua/ha.	NC
Frambueso Frutilla	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	350 g/100 L (2,1 - 2,8 kg/ha)	Aplicar desde inicio de flor a precosecha*. Aplicaciones por temporada: 4 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 600 - 800 L/ha.	NC
Arándano	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	350 g/100 L (2,1 - 2,8 kg/ha)	Aplicar desde inicio de flor a precosecha*. Aplicaciones por temporada: 4 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 600 - 800 L/ha.	NC

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones*	Carencia (días)
Ají Berenjena Pepino dulce Pimentón Tomate aire libre Tomate invernadero	Oídio (<i>Erysiphe polygoni</i> , <i>Leveillula taurica</i>) Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	250 - 400 g/100 L (mín. 2 kg/ha)	Aplicar preventivamente en periodos críticos. Aplicaciones por temporada: - 8 a 12 para oídio. - 4 a 6 para botritis. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días. Mojamiento sugerido: 500 - 1.000 L/ha. según estado de desarrollo del cultivo.	NC

NC: No corresponde

Asegurar un buen mojamiento del follaje, flores y frutos cuando corresponda.

*: cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Los mejores resultados se logran con un programa preventivo de aplicaciones. En caso de control curativo con condiciones propicias para el desarrollo de la enfermedad, usar los intervalos de aplicación menores.

PREPARACION DE LA MEZCLA

Llenar con agua hasta la mitad del estanque del equipo aplicador y agregar lentamente la cantidad recomendada de **Fungi•K 82% SP**. Luego, completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo una agitación constante. Aplicar inmediatamente.

PRECAUCIONES

- Alternar las aplicaciones con fungicidas de otros grupos químicos (IRAC) o distinto modo de acción.
- No aplicar con temperaturas superiores a 25°C.
- En vides de mesa, respetar el mojamiento y la dosis máxima, ya que se pueden generar depósitos en las bayas, afectando su condición final.
- Para aplicar **Fungi•K 82% SP**, esperar mínimo 3 días si hubo un tratamiento anterior y luego esperar mínimo 3 días para aplicar otro producto.
- **Fungi•K 82% SP** es altamente soluble en agua, no aplicar cuando se espera lluvia.
- Evitar la deriva por viento sobre cultivos vecinos.
- Utilizar siempre las concentraciones mayores para los menores volúmenes de agua.
- **Fungi•K 82% SP** es un producto higroscópico, capaz de absorber humedad del medio. Mantener el envase bien cerrado y evitar almacenar en lugares húmedos, pues las características del producto y su desempeño en el campo se pueden ver afectados.
- Clasificación ecotoxicológica para abejas “**VIRTUALMENTE NO TÓXICO**”.

COMPATIBILIDAD

- Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

INCOMPATIBILIDAD

- No se registraron incompatibilidades en pruebas específicas realizadas. Sin embargo, se recomienda no aplicar con productos sensibles a la degradación alcalina.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad si se utiliza de acuerdo con la forma y dosis indicadas. Evitar la deriva del producto en condiciones ventosas.

TIEMPO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

® *marca registrada de Agrospec S.A.*