

NUTRA COLOR

Lote N°: Fecha fabric./Fecha venc.:

Mezcla de bioestimulante no microbiano con
fertilizante inorgánico compuesto por
macro y micronutrientes

Líquido en solución

Composición	% m/v
Materia seca (% m/m)	54,7
Óxido de potasio (K ₂ O)	23,0
Carbono (C)	14,0
Aminoácidos libres (L-α-aminoácidos)	5,0
Boro (B)	3,0
Óxido de magnesio (MgO)	0,8
Molibdeno (Mo)	0,4
Contaminantes	ppm
Arsénico	< 0,5
Cadmio	< 0,5
Cobre	< 10
Cromo VI	< 2
Mercurio	< 0,5
Níquel	< 10
Plomo	< 0,5
Zinc	10
<i>Escherichia coli</i>	ausente
<i>Salmonella</i> sp.	ausente
Parámetros fisicoquímicos	
Densidad (a 20°C)	1,37 g/mL
pH (10% a 20°C)	5,5

Fabricado por

Agrospec®

Camino El Milagro 257, Maipú. Santiago, Chile.
agrospec.cl
Contenido neto:

Principales características

Bioestimulante y fertilizante inorgánico foliar, a base de aminoácidos (L-α-aminoácidos) de origen vegetal y macro y micronutrientes. Está formulado para la maduración de frutales y vides, para promover mejoras en los parámetros de calidad (grados brix, color) y de producción (peso, calibre de frutos). En nogales, favorece la apertura del pelón, facilitando la cosecha.

Recomendaciones de uso vía foliar

Cultivo	Dosis*	Observaciones
Clementino, limonero, mandarino, naranjo, pomelo y tangelo.	4 - 6 L/ha	Aplicar desde el inicio del cambio de color en frutos (pinta). Aplicaciones por temporada: 2 a 3, cada 7 a 10 días.
Nogal	4 - 6 L/ha	Aplicar desde el inicio de la apertura de pelón. Repetir a los 7 a 10 días, si fuera necesario. Si se aplica junto a la mitad de la dosis normal de etefón, mantener la dosis recomendada.
Vid de mesa, vid pisquera y vid vinífera.	4 - 6 L/ha	Aplicar desde el inicio de ablande o cambio de color en frutos (pinta). Si se aplica junto a la mitad de la dosis normal de etefón o de ácido abscísico, se puede usar 3 a 4 L/ha. Aplicaciones por temporada: 2 a 3, cada 7 a 10 días.
Manzano, membrillero y peral.	4 - 6 L/ha	Comenzar las aplicaciones en inicio de cambio de color. Aplicaciones por temporada: 2 a 3, cada 7 a 10 días.
Cerezo, ciruelo, damasco, duraznero y nectarino.	4 - 6 L/ha	Aplicar desde el inicio de cambio de color en frutos (pinta). Aplicaciones por temporada: 2 a 3, cada 7 a 10 días.
Arándano, cranberry, frambueso, frutilla, mora y zarzaparrilla.	3 - 5 L/ha	Comenzar las aplicaciones en inicio de cambio de color (pinta). Aplicaciones por temporada: 2 a 3, cada 7 a 10 días.
Aji, berenjena, pimentón y tomate.	3 - 5 L/ha	Comenzar las aplicaciones en inicio de cambio de color (pinta). Aplicaciones por temporada: 2 a 3, cada 7 a 10 días.

*: para aplicaciones con ultra bajo volumen, mantener la dosis/ha.

Instrucciones de uso

- Agregar al estanque del equipo aplicador a medio llenar, con el agitador funcionando y completar el estanque con agua.
- No aplicar en frutales o cultivos bajo estrés abiótico.

Incompatibilidad y fitotoxicidad

- Compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común, excepto con los de marcada reacción alcalina. En caso de dudas, efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas, sin embargo, en algunas variedades de carozos se recomienda hacer pruebas en pequeña escala.

Precauciones

- Producto no tóxico, sin embargo, usar medidas de protección propias del manejo de un fitosanitario. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipo de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
- Condiciones de almacenamiento: conservar el producto en una bodega seca, fresca y ventilada, protegido de la luz solar directa, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta.