



NOMBRE COMUN	Nutra Color	
INGREDIENTE ACTIVO	Potasio, carbono, aminoácidos libres (<i>L-α-aminoácidos</i>), boro, magnesio y molibdeno.	
FORMULACION	Líquido en solución	
COMPOSICION		% m/v
	Óxido de potasio (K ₂ O)	23,0
	Carbono (C)	14,0
	Aminoácidos libres (<i>L-α-aminoácidos</i>)	5,0
	Boro (B)	3,0
	Óxido de magnesio (MgO)	0,8
	Molibdeno (Mo)	0,4

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Bioestimulante y fertilizante foliar, a base de aminoácidos (*L-α-aminoácidos*) de origen vegetal, macro y micronutrientes. Está formulado para apoyar la maduración de frutales y vides, promoviendo mejoras en los parámetros de calidad (grados brix, color) y de producción (peso, calibre de frutos). En nogales, favorece la apertura del pelón, facilitando la cosecha.

RECOMENDACIONES DE USO

Vía foliar

Cultivo	Dosis*	Observaciones
Clementino, limonero, mandarino, naranjo y pomelo.	4 - 6 L/ha	Aplicar desde el inicio del cambio de color en frutos (pinta). Aplicaciones por temporada: 2 a 3, cada 7 a 10 días.
Nogal	4 - 6 L/ha	Aplicar desde el inicio de la apertura de pelón. Repetir a los 7 a 10 días, si fuera necesario. Si se aplica junto a la mitad de la dosis normal de etefón, mantener la dosis recomendada.
Vid de mesa, vid pisquera y vid vinífera.	4 - 6 L/ha	Aplicar desde el inicio de ablande o cambio de color en frutos (pinta). Si se aplica junto a la mitad de la dosis normal de etefón o de ácido abscísico, se puede usar 3 a 4 L/ha. Aplicaciones por temporada: 2 a 3, cada 7 a 10 días.

Cultivo	Dosis*	Observaciones
Manzano, membrillero y peral.	4 - 6 L/ha	Comenzar las aplicaciones al inicio de cambio de color. Aplicaciones por temporada: 2 a 3, cada 7 a 10 días.
Cerezo, ciruelo, damasco, duraznero y nectarino.	4 - 6 L/ha	Aplicar desde el inicio de cambio de color en frutos (pinta). Aplicaciones por temporada: 2 a 3, cada 7 a 10 días.
Arándano, cranberry, frambueso, frutilla, mora y zarzaparrilla.	3 - 5 L/ha	Aplicar desde el inicio de cambio de color en frutos (pinta). Realizar 2 a 3 aplicaciones cada 10 a 12 días.
AjÍ, berenjena, pimentón y tomate.	3 - 5 L/ha	Comenzar las aplicaciones al inicio de cambio de color (pinta). Aplicaciones por temporada: 2 a 3, cada 7 a 10 días.

*: para aplicaciones con ultra bajo volumen, mantener la dosis/ha.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agregar al estanque del equipo aplicador a medio llenar, con el agitador funcionando y completar el estanque con agua.
- No aplicar en frutales o cultivos bajo estrés abiótico.

INCOMPATIBILIDAD

- Compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común, excepto con los de marcada reacción alcalina. En caso de dudas, efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas, sin embargo, en algunas variedades de carozos se recomienda hacer pruebas en pequeña escala.